

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018
PADRÃO DE RESPOSTAS - DEFINITIVO

PROVA PARA O PROGRAMA DE PSQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Situação-Problema 1

- A) Delirium.
- B) Psicose induzida por substâncias ou fármacos de ação anti-colinérgica.
- C) ANULADA.

Situação-Problema 2

- A) 1. Transtorno de Estresse Pós-traumático diagnosticado através dos seguintes critérios: Pesadelos, insônia e isolamento **OU** Evitação do contexto aonde ocorreu o estressor **OU** Hiperreatividade neurovegetativa.
2. Depressão Recorrente - Episódio Atual Grave diagnosticado através dos seguintes critérios Anedonia – Ideação de ruína e Perda de apetite e Perda de concentração e Atenção prejudicada.
- B) 1. Hematoma subdural ou quadro demencial leve.
2. Procedimento recomendado: Ressonância Magnética de Crânio **OU** TC de Crânio.
- C) Fluoxetina **OU** Mirtazapina.

Situação-Problema 3

- A) 1. Suspeita: Autismo.
2. Critérios: Menor desenvolvimento na aquisição da linguagem **OU** Baixa capacidade de estabelecer relações **OU** Ausência de reciprocidade **OU** Padrões repetitivos e estereotipados de comportamento.
- B) Diagnósticos: Síndrome de Rett **OU** Síndrome de Asperger **OU** outro transtorno desintegrativo da infância.
- C) Cuidadoso incremento do suporte social, fonoaudiologia, terapia ocupacional, orientação a pais e professores.

Situação-Problema 4

- A) Demência vascular
- B) Ressonância Magnética ou Tomografia de Crânio
- C) Redução dos fatores de risco: controle de PA ou redução de colesterol e triglicérides.

Situação-Problema 5

- A) Transtorno Bipolar tipo II, com ciclagem rápida.
- B) Carbonato de Lítio OU Valproato de Sódio OU Lamotrigina OU Carbamazepina.
- C) 1. Anticonvulsivantes, tipo Valproato de Sódio OU Lamotrigina OU Carbamazepina.(caso tenha sido apontado Carbonato de Lítio no item B)
- D) 2. Carbonato de Lítio .(caso tenha sido apontado Anticonvulsivantes no item B)
3. Um neuroléptico atípico, tipo olanzapina ou quetiapina ou ziprazidona ou paliperidona.

Situação-Problema 6

- A) 1. Hipotireoidismo
2 Diabetes Insipidus
- B) Carbonato de Lítio
- C) 1 Hidroclorotiazida,
2. Indometacina e Captopril.

Situação-Problema 7

- A) Cocaína ou qualquer anfetamina.
- B) Dosagem urinária ou sérica.
- C) Sedação com benzodiazepínicos ou neurolépticos.

Situação-Problema 8

- A) Inibição do metabolismo da wafarina.
- B) Aumento do metabolismo da wafarina.
- C) Substituição da fluoxetina por outro ISRS com menor interação medicamentosa OU Substituição por citalopram ou escitalopram ou pela sertralina.

Situação-Problema 9

- A) 1. Personalidade anti-social
2. Dependência ao álcool
- B) Introdução de Benzodiazepínicos e reposição de tiamina.
- C) Reservado ou Pobre.

Situação-Problema 10

- A) Transtorno Obsessivo-compulsivo.
- B) Pensamentos obsessivos, rituais compulsivos.
- C) Clomipramin OU Fluoxetina OU Paroxetina OU Fluvoxamin OU Citalopram OU Escitalopram, OU qualquer outro inibidor de recaptção de serotonina.

Situação-Problema 11

- A) Transtorno de tiques vocais e motores múltiplos combinados OU Transtorno de Tourette OU Síndrome de Gilles de la Tourette.
- B) Haloperidol OU Trufluoperazina OU Pimozida OU Risperidona OU Olanzapina.
- C) Neurológica: Coréia de Huntington OU Coréia de Sydenham.
Psiquiátrica: Transtorno crônico de Tique motor ou vocal OU Transtorno de Tique transitório.

Situação-Problema 12

- A) Transtorno de Ansiedade Generalizada E Preocupação e apreensão E/OU Tensão motora E/OU Hiperatividade autonômica.
- B) 1 - Hipocondria: preocupação com uma única doença;
2 - Transtorno Obsessivo-compulsivo: Ruminações não são ligadas a crenças irracionais nem há compulsão a atos repetitivos.
3 - Fobia social: ansiedade não é ligada à avaliação de outrem.
- C) 1-Inibidores Seletivos de Recaptção de Serotonina: Citalopram, Paroxetina, Sertralina, Escitalopram.
2- Inibidores Seletivos de Recaptção de Serotonina e Noradrenalina: Venlafaxina e Duloxetina.

Situação-Problema 13

- A) Início insidioso, ausência de suporte social, controle pobre de sintomas positivos, início precoce, hetero-agressividade sustentada.
- B) Discinesia tardia.
- C) Introdução de clozapina.

Situação-Problema 14

- A) 1- Transtorno esquizóide de personalidade
2- Dependência de anfetaminas
3- Dependência de Benzodiazepínicos

- C) Semi-imputável

- D) 1- Agravantes: uso pré-ordenado de álcool
2- Atenuantes: emoção decorrente da humilhação; efeito decorrente da anfetamina

Situação-Problema 15

- A) Personalidade Borderline.

- B) Antidepressivo tricíclico.

- C) Internação psiquiátrica..