

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2019
PADRÃO DE RESPOSTAS - DEFINITIVO**PROVA PARA O PROGRAMA DE PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**

As provas foram corrigidas com base no Padrão de Respostas Definitivo divulgado considerando, também, expressões médicas equivalentes ou correlatas, sinonímias, indicação de procedimentos e de medicamentos de classes semelhantes, desde que tenham evidenciado a competência principal exigida em cada situação específica e tenham apresentado o necessário nível de precisão da resposta, e validados pela Banca.

Situação-Problema 1

- A) Tabagismo **OU** uso de cigarro.
- B) Duas das seguintes:
- Agranulocitose **OU** Neutropenia **OU** Leucopenia **OU** Miocardite **OU** cardiomiopatia
 - Convulsões **OU** status epilepticus **OU** epilepsia
 - Taquiarritmias **OU** arritmia cardíaca
 - Tromboembolismo **OU** TVP **OU** TEP.
- C) Semanal nas primeiras 18 semanas, mensal a partir de então para sempre **OU** semanal nos primeiros 6 meses, mensal a partir de então para sempre.

Situação-Problema 2

- A) 10 a 20 vezes a dose diária **OU** 10 a 15 vezes a dose diária **OU** Cada 5mg equivale a 1 a 2 ampolas **OU** Cada ampola equivale a 2,5mg.
- B) Queda de libido **OU** Disfunção sexual **OU** Ginecomastia.
- C) Benzodiazepínicos **E** Betabloqueadores.

Situação-Problema 3

- A) Inibidores seletivos da recaptção de serotonina **OU** ISRS
- B) Exposição **E** prevenção de resposta **OU** Exposição **E** prevenção de rituais **OU** EPR
- C) Clozapina.

Situação-Problema 4

- A) Catatonía **OU** Síndrome catatônica **OU** estupor catatônico.
- B) Benzodiazepínicos.
- C) Flexibilidade cérea **OU** Flexibilidade cerácea **OU** Cereais flexibilitas.

Situação-Problema 5

- A) Demência por corpúsculos/corpos de Lewy **OU** Demência de Lewy **OU** Doença de Lewy.
- B) Anticolinesterásicos **OU** Rivastigmina **OU** Galantamina **OU** Donepezila.
- C) Clozapina **OU** Quetiapina **OU** Aripiprazol.

Situação-Problema 6

- A) Glutamatérgico.
- B) Elevação da pressão arterial.
- C) Síndrome ou Delírio de Cotard **OU** Delírio de negação (de órgãos) **OU** Delírio niilista.

Situação-Problema 7

- A) Diabetes insipidus nefrogênico **E** induzido pelo lítio.
- B) Teste de restrição hídrica **OU** Osmolalidade urinária.
- C) Amilorida Hidroclorotiazida **OU** Indometacina **OU** Desmopressina.

Situação-Problema 8

- A) Unilateral direito **OU** Unilateral.
- B) Lítio **E** clonazepam.
- C) Tempo de convulsão motora.

Situação-Problema 9

- A) Hiponatremia por Secreção inapropriada de hormônio antidiurético **OU** Hiponatremia por SIHAD / SIADH **OU** SIHAD / SIADH por escitalopram.
- B) Reduzir e suspender o escitalopram **OU** suspender o escitalopram.
- C) Medo / receio / ansiedade de estar em lugar cuja saída vai ser difícil em caso de ataque de pânico/ansiedade **OU** Medo/receio/ansiedade de estar em lugar onde ajuda será difícil em caso de ataque de pânico / ansiedade.

Situação-Problema 10

- A) Alexitimia.
- B) Defeitos do tubo neural **OU** espinha bífida.
- C) Manter sem medicação **E** reforçar necessidade de retomar psicoterapia.

Situação-Problema 11

- A) Naltrexona **OU** Naltrexone **OU** Dissulfiram
- B) **Se** naltrexona: Bloqueio de receptores opioides **OU** Antagonista opioide.
Se dissulfiram: Inibição/bloqueio da aldeído/acetaldéido desidrogenase.
- C) Citar três dos seguintes:
 - Paciente motivado **OU** motivação **OU** busca espontânea
 - Frequentando AA
 - Sem uso de outras substâncias
 - Ausência de comorbidades clínicas
 - Função hepática normal

Situação-Problema 12

- A) Internação compulsória.
- B) Benzodiazepínicos.
- C) Dopamina.

Situação-Problema 13

- A) IMC normal **OU** Ausência de baixo peso.
- B) Ingestão de grande quantidade de alimentos, em um curto espaço de tempo, com sensação de perda de controle.
- C) Borderline **OU** Emocionalmente instável **OU** com instabilidade emocional

Situação-Problema 14

- A) Delirium tremens.
- B) Diazepam endovenoso.
- C) Histórico de uso de álcool.

Situação-Problema 15

- A) Travestismo fetichista.
- B) Aumentar dose da amitriptilina.
- C) Apresentou resposta do quadro depressivo, porém não remissão **OU** Dose da amitriptilina ainda é baixa **OU** resposta incompleta.