

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018
PADRÃO DE RESPOSTAS – PRELIMINAR

PROVA PARA O PROGRAMA DE ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Situação-Problema 1

- A) *Candida sp.* **OU**
Candida albicans
- B) Exame a fresco **OU**
Estudo da lâmina a fresco **OU**
Exame a fresco com hidróxido de potássio a 10%.
- C) Fluconazol, 150mg, 1 comprimido, via oral, dose única **OU**
Itraconazol 100 mg, 2 comprimidos, VO, 2xdia, por 1 dia.

Situação-Problema 2

- A) 1. Anticorpo Anticoagulante Lúpico
2. Anticorpo Anti-cardiolipina.
3. Anti-b2 glicoproteína 1.
- B) Aspirina **OU** AAS **OU** ácido acetilsalicílico **E** Heparina **OU**
Heparina de Baixo Peso Molecular **OU**
Heparina Não-fracionada **OU**
Dalteparina **OU**
Enoxaparina **OU** Clexane.
- C) Alteração principal: Presença de aderências uterinas **OU**
Cicatrizes **OU**
Sinéquias uterinas.
Causas: múltiplas curetagens uterinas **OU**
Radioterapias **OU**
Cesariana **OU**
Endometrites.

Situação-Problema 3

- A) BIRADS 4 **OU**
4A.
- B) Lesão suspeita para câncer de mama **OU**
Lesão com baixo grau de suspeição para câncer de mama.
- C) Biópsia da lesão suspeita.

Situação-Problema 4

- A) Sífilis **OU**
Sífilis Secundária.

- B) Penicilina Benzatina, 2.400.000UI (ou 1.200.000UI em cada nádega), intramuscular, dose única.

- C) 1. Tratamento ausente.
2. Ausência de queda nos níveis de VDRL
3. Companheiro (ou parceiro) não tratado.
4. Ausência de documentação do tratamento.
5. Tratamento com Estearato de Eritromicina.
6. Não abstinência sexual até final do tratamento.

Situação-Problema 5

- A) Gestação Ectópica Rota.

- B) Laparotomia Exploradora **OU**
Laparoscopia.

- C) Não será possível no momento a realização da profilaxia com imunoglobulina anti-D, visto tratar-se de uma paciente com Coombs indireto positivo, ou seja, já sensibilizada.

Situação-Problema 6

- A) Atrofia endometrial.

- B) Histeroscopia com biópsia.

- C) Até 64 anos.

Situação-Problema 7

- A) Linfogranuloma Venéreo **OU**
Mula **OU**
Doença de Nicolas-Favre **OU**
Linfogranuloma inguinal **OU**
Bubão.

- B) Chlamydia Trachomatis **OU**
Clamidia trachomatis **OU** Chlamydia trachomatis cepas L1, L2 ou L3).

- C) Doxiciclina, via oral, de 12 em 12 horas por 21 dias **OU**
Azitromicina 1g, via oral, 1x por semana por 3 semanas **OU**
Eritromicina 500mg, via oral, de 6 em 6 horas por 21 dias **OU**
Tetraciclina 500mg, via oral, de 6 em 6 horas por 21 dias.

Situação-Problema 8

- A) Telarca **OU**
Desenvolvimento do broto mamário **OU**
Crescimento das mamas.

- B) M2 e P2.

- C) Uso de Análogo de GnRH **OU**
Agonista de GnRH.

Situação-Problema 9

- A) 1. Insinuação **OU** Flexão e insinuação.
2. Descida **OU** Flexão e descida **OU** Progressão.
3. Rotação interna
4. Desprendimento do polo cefálico **OU** Deflexão e desprendimento do polo cefálico.
5. Rotação externa
6. Desprendimento do ovoide córmico **OU** Desprendimento do tronco **OU** Desprendimento das espáduas **OU** Desprendimento do polo pélvico.

- B) Occípito Esquerda Anterior **OU**
OEA.

- C) Lambda **OU** Fontanela lambdoide **OU** Fontanela posterior **OU** Pequena fontanela
E
Sutura sagital.

Situação-Problema 10

- A) CIVD **OU**
Coagulação Intravascular Disseminada **OU**
Coagulopatia.

- B) Coagulograma **OU** Tempo de Sangramento (TS),
E
Atividade da Protrombina (AP) **OU** Tempo de Protrombina (TP),
E
Tempo de Ativação Parcial da Tromboplastina (TTPA) e plaquetas.

- C) Indução do trabalho de parto associado a analgesia (ou anestesia) **OU**
Preparo do colo com misoprostol seguido de ocitocina associado a analgesia (ou anestesia)

Situação-Problema 11

- A) Fibroma.

- B) Síndrome de Meigs

- C) Prognóstico bom após ooforectomia **OU**
Anexectomia.

Situação-Problema 12

- A) Gestação anembrionada
- B) Novo ultrassom com 1 semana **OU** Novo ultrassom em 1 semana
E
Repetir beta-HCG.
- C) Abortamento incompleto.

Situação-Problema 13

- A) Método de Krause **OU**
Balão intracervical **OU**
Uso de sonda de Foley **OU**
Cateter extra amniótico.
- B) Tração digital oposta ao polo cefálico **OU**
Manter o toque vaginal descomprimindo o cordão umbilical **OU**
Manter os dedos do toque vaginal
E
Indicar cesariana de urgência.
- C) Após 4 semanas.

Situação-Problema 14

- A) Mola Hidatiforme Parcial **OU**
Mola parcial **OU**
Mola parcial e cistos teca-luteínicos) .
- B) Hiperêmese gravídica.
- C) Esvaziamento uterino **OU**
Aspiração à vácuo **OU**
Aspiração manual intrauterina **OU**
AMIU **OU**
Curetagem.

Situação-Problema 15

- A) Vitrificação oocitária **OU**
Congelamento de óvulos (ou embriões) **OU**
Preservação da fertilidade.
- B) Radioterapia.
- C) Uso de Tamoxifeno **OU**
Uso de SERM **OU**
Modulador seletivo do receptor de estrogênio **OU**
Hormonioterapia .