

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018

PADRÃO DE RESPOSTAS – PRELIMINAR

PROVA PARA O PROGRAMA DE ECOGRAFIA VASCULAR COM DOPPLER

Situação-Problema 1

- A) Crawford tipo 2 **OU**
Crawford tipo II
- B) Acompanhamento Clínico **OU**
Seguir acompanhando o diâmetro do aneurisma através de exames de imagem **OU**
Seguir acompanhando o diâmetro do aneurisma **OU**
Conduta expectante **OU**
Seguimento Clínico **OU**
- C) Endoleak tipo III **OU**
Tipo 3.

Situação-Problema 2

- A) Heparina não fracionada / Sim (TTPA) **OU**
Heparina não fracionada / Sim TTPA (tempo de tromboplastina parcial ativada).
- B) Anti-vitamina K **OU**
Varfarina (anti vitamina K) **OU**
Coumadin (anti vitamina K) **OU**
Marevan (anti vitamina K) .
- C) Suspende anticoagulante e implante de Filtro de veia cava inferior **OU**
Suspende anticoagulante (e prescrever plasma fresco) + implante de filtro de veia cava.

Situação-Problema 3

- A) Fontaine 2B **OU** 2B **OU** IIB.
- B) 1. Antiagregante Plaquetário **OU** AAS **OU** Clopidogrel.
2. Estatinas **OU** Sinvastatina **OU** Atorvastatina **OU** Qualquer outra estatina.
3. Vasodilatadores periféricos **OU** Cilostazol **OU** Pentoxifilina.
- C) TASC B

Situação-Problema 4

- A) Utilização de Shunt carotídeo **OU**
Shunt carotídeo **OU**
Shunt.
- B) Lesão de ramo mandibular do nervo facial **OU**
Lesão de ramo mandibular **OU**
Lesão marginal do nervo facial.
- C) 1. Antiagregante Plaquetário **OU** AAS **OU** Clopidogrel.
2. Estatinas **OU** Sinvastatina **OU** Atorvastatina **OU** Qualquer outra estatina

Situação-Problema 5

- A) Antibioticoterapia **OU** Cobertura de gram +, gram- e pseudomonas
E
Amputação de 4º pododáctilo **OU** Tratamento cirúrgico com amputação de 4º pododáctilo direito.
- B) Wagner 4 **OU** Wagner IV.
- C) 1. Controle regular do diabetes (dieta, seguimento com endocrinologista) **OU** Compensação do diabetes.
2. Inspeção diária dos pés **OU** Atentar para ferimentos nos pés **OU** Cortar as unhas adequadamente.
3. Calçados apropriados **OU** Utilização de calçados apropriados

Situação-Problema 6

- A) Ultrassom Doppler Venoso **OU**
Doppler venoso **OU**
Duplex Scan venoso **OU**
USG doppler venoso.
- B) CEAP 3
- C) Citar duas das seguintes veias:
Veia epigástrica superficial **OU**
Veia circunflexa ilíaca superficial **OU**
Veia pudenda externa **OU**
Veia safena acessória anterior **OU**
Veia safena acessória posterior **OU**
Veia safena acessória medial **OU**
Veia safena acessória lateral.

Situação-Problema 7

- A) Arterite de TAKAYASU **OU**
Aortite de Takayasu
- B) Corticoterapia **OU**
Administração de corticoides (Corticoesteroides)
- C) Estenose de artéria renal **OU**
Estenose de artéria renal devido acometimento pela arterite.

Situação-Problema 8

A) Veia femoral (Direita ou esquerda).

Justificativa: Paciente com coagulopatia e possibilidade de compressão manual local caso haja formação de hematoma

OU

Veias femorais.

Justificativa: Possibilidade de comprimir o local se houver hematoma, devido coagulopatia (alteração do RNI e plaquetas).

B) Utilização de Ultrassom para guiar punção **OU**

Usar Ultrassom para punção eco-guiada.

C) Tratamento endovascular com implante de Stent revestido **OU**

Implante de Stent revestido ou recoberto. (implante de stent Viabahn).

Situação-Problema 9

A) Síndrome compartimental aguda **OU**

Síndrome compartimental.

B) Nenhum exame complementar. Diagnóstico é clínico **OU**

Nenhum exame. Diagnóstico é baseado no quadro clínico.

C) Fasciotomia **OU**

Fasciotomia de perna **OU**

Fasciotomia medial e lateral de perna.

Situação-Problema 10

A) Rutherford 3 **OU Rutherford III **OU** Oclusão arterial aguda Rutherford 3.**

B) Aneurisma de artéria poplítea trombosado **OU**

Oclusão arterial aguda por aneurisma de poplítea trombosado membro inviável

Trombose de aneurisma de artéria poplítea.

C) Amputação primária transfemoral de membro inferior direito **OU**

Amputação de coxa direita **OU**

Amputação suprapatelar direita **OU**

Amputação transfemoral direita.

Situação-Problema 11

- A) Úlcera Hipertensiva **OU** Úlcera de Martorell **OU** Úlcera hipertensiva de Martorell.

- B) Controle da Hipertensão Arterial **OU**
Controle pressórico **OU**
Controle dos níveis pressóricos.

- C) Simpatectomia Lombar **OU** Simpatectomia.

Situação-Problema 12

- A) Exploração cirúrgica imediata **OU**
Tratamento cirúrgico imediato **OU**
Exploração vascular.

- B) Interposição de enxerto femoro-femoral com veia safena contralateral no segmento arterial lesado E ligadura de veia femoral superficial **OU**
Ressecção do segmento arterial com lesão térmica E enxerto (ou by-pass) com veia safena invertida contralateral E ligadura de veia femoral superficial **OU**
Ponte (ou by-pass) femoro-femoral com veia safena contralateral E ligadura da veia femoral.

- C) Fasciotomia **OU**
Fasciotomia de perna **OU**
Fasciotomia medial e lateral de perna.

Situação-Problema 13

- A) Tromboangeite Obliterante **OU**
Doença de Buerger.

- B) Sinal de Martorell **OU**
Sinal de Martorell/ Circulação colateral com artérias espiraladas com padrão de “saca rolha”.

- C) Cessação/interrupção do tabagismo **OU**
Parar de fumar **OU**
Cessar tabagismo.

Situação-Problema 14

- A)** Citar 3 destas terapias:
Terapia compressiva **OU**
Cuidados com a pele **OU**
Medicações linfocinéticas **OU**
Fisioterapia **OU**
Terapia física complexa.
- B)** Sinal de Stemmer + **OU** Sinal de Stemmer positivo.
- C)** Mowlem 3

Situação-Problema 15

- A)** Choque hipovolêmico **OU**
Choque por hemorragia **OU**
Choque por perda volêmica **OU**
Choque por perda sanguínea.
- B)** Acesso intra-ósseo **OU**
Punção intra-óssea **OU**
Acesso por punção óssea.
- C)** Tíbia anteromedial esquerda **OU**
Tíbia esquerda **OU**
Tibia.